Sobre una rara especie de Euptoëta

(RHOPALOCERA, NYMPHALIDAE)

Euptoëta Ramirezi Giac. n. sp.

Por el Dr. Eugenio Giacomelli

Esta notabilísima y rara especie de *Euptoëta* es completamente diferente de todas las demás especies del género qué bien conozco y poseo. Tiene el porte y aspecto de la conocida *Euptoëta Hortensia* Blanch., pero su coloración la hace inconfundible de todas las demás. En la página superior el fondo es de color anaranjado rojizo vivo, análoga al de *Euptoëta Hegesia* Cram., pero mucho más vivo, y sobre éste se destacan en las primeras alas, a la base de la célula una « *vírgula* » negra seguida de una gran mancha también negra aterciopelada intenso: de este mismo color es una amplia faja que va desde el borde anterior hasta la mitad del borde interno seguida casi inmediatamente de otra faja negra algo más delgada paralela a aquella, dirigida desde la proximidad del ángulo apical hacia el ángulo externo, formada de manchas oculares poco visibles confluentes: la región del borde externo y franja quedan de color naranja rojizo. Dichas dos fajas se continúan sobre el ala del segundo par: en ésta las manchas oculares que forman la faja negra exterior son más netas y visibles. Todas las nervaduras son distintamente negras. En la página inferior las alas del primer par son también de color anaranjado rojizo, más vivo en la base, en ella resaltan netamente las dos manchas de la célula; las fajas negras descritas en la página superior se disuelven más netamente que en ésta, en manchas que ocupan los espacios internervulares; la faja externa se esfuma y borra hacia el ángulo apical en manchas color herrumbe.

Las alas del segundo par presentan un color casi uniformemente rojizo herrumbe, sólo interrumpido por una mancha netamente visible triangular casi al centro mismo del ala, de color amarillo, precedida de otra basal menos visible del mismo color. Todo el campo de estas

alas está atravesado por tres fajas: una basal, otra mediana y otra premarginal gris claro, poco visibles. Hacia el ángulo anterior, el color del fondo se vuelve más claro, menos intensamente ferrugíneo, casi amarillo. El cuerpo es superiormente amarillo rojizo, inferiormente rojizo. Las antenas negruzcas con la maza inferiormente rojiza: palpos superiormente negruzcos, inferiormente amarillentos; patas negruzcas.



Euptoëta Ramirezi Giac., n. sp.
Habitat: Cosquin F.C.N.N.A., Prov. de Córdoba (R.A.)

Expansión alar 50 mm. El ejemplar parece ♂. Dedico esta soberbia especie de *Euptoëta*, interesantísima y rara a mi diligente y activo ayudante José Pedro Ramírez, quien la encontró conmigo en Cosquín, F. C. C. N. A., provincia de Córdoba (R. A.), en el paraje llamado « *La Higuera del Ahorcado* ». El color de esta *Euptoëta* tan intenso y diferente de las demás especies del género, haría pensar en un ejemplar melanótico de la *Euptoëta Hortensia* allí tan común, pero el hecho lamentable de habérsenos escapado otro ejemplar en un potrero inmediato al lugar citado, me prueba ser una verdadera y propia n. sp. que parece ser allí extremadamente rara.

« Tipo » único (♂ ?) en mi colección.

La Rioja, 17 de febrero de 1926.